

Wenkbrauwlift

In vele gevallen is bij mannen eerder een wenkbrauwlift nodig dan bij vrouwen het geval is. Dit komt doordat mannen de afstand van de ogen naar de wenkbrauwen een stuk kleiner hebben, waardoor het lijkt alsof men hangende oogleden heeft. Vaak wordt voor het bereiken van een optimaal resultaat een combinatie gemaakt van een bovenooglidcorrectie met een wenkbrauwlift.

Voor de behandeling

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft; welke methode voor u het beste is en wat u als resultaat kunt verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt tijdens dit intake een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode daarna.

De behandeling

Voorafgaand aan een behandeling worden er foto's gemaakt voor in uw medisch dossier. Een wenkbrauwlift wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Er wordt een sneetje van ongeveer vijf centimeter boven elke wenkbrauw gemaakt. Vervolgens wordt de huid onderhuids losgemaakt tot aan de wenkbrauw. De huid wordt nu glad en strak getrokken totdat de wenkbrauw op de juiste hoogte ligt. Het teveel aan huid wordt verwijderd en de incisie wordt gehecht.

De ingreep zelf duurt maximaal een uur, de voorbereiding op de ingreep neemt ongeveer een half uur in beslag.

Na de behandeling

De wondjes worden gehecht en afgeplakt met watervaste pleisters. Na de ingreep mag u meteen naar huis, u mag zelf NIET autorijden. Na een week komt u terug voor controle naar de kliniek. Na twee of drie weken worden de hechtingen verwijderd.

Risico's en complicaties

Een wenkbrauwlift wordt doorgaans niet als pijnlijk ervaren. De dagen na de ingreep kunt u last hebben van hoofdpijn, wenkbrauwen zullen na de ingreep een poosje blauw en gezwollen zijn. De zwelling zakt in de loop van een of twee weken weg. De blauwe plekken kunnen vanuit de wenkbrauwen naar beneden zakken en afhankelijk van de intensiteit een tot vier weken zichtbaar zijn.

De littekens moeten droog worden gehouden tot de hechtingen zijn verwijderd. De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar zorg er wel voor dat de littekens droog blijven. Nadat de hechtingen zijn verwijderd kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen. Zorg ervoor dat tijdens het slapen geen druk op uw voorhoofd ontstaat. Het is het beste om met uw hoofd iets hoger te gaan liggen.

Na een wenkbrauwcorrectie moet u het enkele dagen wat rustiger aan doen, zodat uw lichaam tijd heeft om te herstellen. Wanneer de hechtingen zijn verwijderd mag u weer langzaam beginnen met sporten en andere zware lichamelijke inspanning. De meeste mensen gaan na een paar dagen weer aan het werk.

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding.

Specifieke risico's van een wenkbrauwlift zijn asymmetrie (die meestal vooraf ook al bestaat), vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens en tijdelijke gevoelloosheid in een deel net boven de wenkbrauw. Roken vergroot de kans op een infectie. Daarom raden we u dringend aan om drie weken voor de ingreep te stoppen, en ook drie weken na de ingreep niet te roken.

Te verwachten resultaat

De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering, maar uw gezicht wordt er niet opeens 'perfect' door. Kort na de ingreep is het resultaat al enigszins zichtbaar. Pas wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is kunt u het resultaat goed beoordelen. Het uiteindelijke resultaat is pas zichtbaar nadat de wond en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn. Dat is zo'n drie maanden na de operatie.

De incisies die worden gemaakt om een wenkbrauwlift uit te kunnen voeren, worden zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden (als dat mogelijk is) verborgen in een huidplooi net boven de wenkbrauw. De eerste maanden kunnen littekens nogal vurig zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen. Uiteindelijk resteert niet meer dan een licht lijntje van vijf centimeter direct boven de wenkbrauw. Tijdens de eindcontrole in de kliniek (na drie maanden) worden foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Tot slot

Wij zullen ons zo goed mogelijk inzetten om uw verblijf in onze kliniek voor u zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Hierbij staan we altijd open voor kritiek, suggesties of opmerkingen, waardoor de kwaliteit van zorgverlening verbeterd kan worden. Wanneer u tijdens uw verblijf suggesties of opmerkingen heeft, schroom dan niet deze met de arts of een van de assistentes te bespreken.

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 16:45 uur, bereiken via telefoonnummer 045-2080887. Uitsluitend voor spoedeisende gevallen, kunt u na 16.45 uur en in het weekend contact opnemen met de spoedlijn, 06-86895787.