

Bovenooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie is niet enkel overvloedige huid weghalen. De patiënten kunnen klachten hebben van zware en vermoeide ogen, een druk achter de ogen, hoofdpijn of gezichtsveldbeperking. Echter ook om cosmetische redenen kan deze ingreep uitgevoerd worden: om er jonger, minder vermoeid en minder somber uit te zien. Uiteraard zullen we rekening houden met uw wensen wat betreft de oogvorm. We zijn heel eerlijk over wat u mag verwachten en vinden het erg belangrijk dat uw verwachtingen niet te hooggestemd of irreëel zijn. Door zware verslapte oogleden of vetpockets bij de ogen te verwijderen, kan de jonge "heldere" blik van vroeger weer worden verkregen. We zullen u altijd duidelijk aangeven wat haalbaar is. Alleen bij een eerlijk en goed advies kunt u optimaal tevreden zijn met u behandeling.

De behandeling

Bij een ooglidcorrectie wordt, onder plaatselijke verdoving, het teveel aan huid en vet weggehaald van de oogleden. Voor een correctie van de bovenoogleden maakt de arts een sneetje in de oogplooi. Er wordt een reepje huid verwijderd en vervolgens wordt het sneetje opnieuw gehecht. Het verwijderen van deze vetkwabbeltjes is essentieel voor een goed en langdurig resultaat. Omdat het litteken precies in de oogplooi valt is het later nauwelijks zichtbaar. Een ooglidcorrectie is een relatief kleine ingreep, maar moet wel met veel inzicht en vakmanschap uitgevoerd worden.

Risico's en complicaties

Bij een ooglidcorrectie treden zelden complicaties of bijwerkingen op. Toch kan het zijn dat er problemen optreden;

Opgezwollen ooglid en ongevoelige ooglidrand:

Door de operatie van het bovenooglid wordt een weefselreactie veroorzaakt en tevens een verstoring van de lymfeafvoer. Hierdoor wordt een deel van de lidrand dikker. Deze zwelling neemt geleidelijk af maar kan wel enkele weken voortduren. Bij het verwijderen van de huid worden ook de zenuwen doorgesneden en kan het ooglid soms enkele weken gevoelloos zijn. Ook dit herstelt geleidelijk.

Oogontsteking

Omdat de lymfeafvoer is verstoord is de kans op een oogontsteking de eerste weken na de behandeling vergroot. Wanneer dit optreedt, is het verstandig opnieuw contact op te nemen met de desbetreffende kliniek of oogchirurg. Deze kan dan beslissen u oogdruppels voor te schrijven.

Littekens

Bij elke patiënt ontstaat een litteken. Deze zijn het gevolg van operatietechnieken en een reactie van de huid daarop. Afhankelijk van het feit of wonden mooi genezen bij de patiënt, is er meer kans op

minder littekenvorming dan bij patiënten waar littekens altijd goed zichtbaar blijven. Bij rokers verslechtert het genezingsproces. Het litteken zal overigens niet of nauwelijks zichtbaar zijn aangezien een gespecialiseerd chirurg de snede zo veel mogelijk in de huidplooi plaatst. Het litteken is op die manier niet of nauwelijks zichtbaar bij rechtuit kijken.

Asymmetrie van de beide huidplooien in de bovenoogleden

Er kan verschil van hoogte bestaan tussen de huidplooi links en rechts. Een geringe asymmetrie is trouwens heel normaal. Zowel voor als na de ooglidcorrectie. Wanneer er na enkele maanden nog steeds duidelijk een storende asymmetrie van de huidplooi zichtbaar is, kan dat worden verholpen door opnieuw een reepje huid te verwijderen.

Zandgevoel en irritatie van het oog door uitdroging

Een zeer weinig voorkomende complicatie. De ooglidrand kan na verwijdering van huid en spier iets te hoog staan, waardoor het ooglid niet voldoende sluit. Tijdens de eerste week is dit normaal vanwege de zwellingen van de oogleden. Hierna neemt dit steeds verder af. Door het litteken kan de sluitfunctie verminderd zijn, waardoor het oog iets sneller uitdroogt. Indien patiënten al een traanfilm van matige kwaliteit of een lage traanproductie hebben, kan een geringe uitdroging van het hoornvlies optreden. Dit voelt aan alsof er zand in het oog zit. Hiervoor kunnen oogdruppels (kunsttranen) gebruikt worden. Mocht er voor de operatie sprake zijn van zeer droge ogen, dan moet men zeer voorzichtig zijn.

Cysten

Op de plek waar de hechtnaald door de huid is gestoken, kunnen soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecysten) ontstaan. In de meeste gevallen verdwijnen deze na verloop van tijd spontaan.

Bloedingen

Hoewel de kans op een (na)bloeding klein is, is deze nooit volledig uit te sluiten. Mocht het toch gebeuren is contact opnemen met de specialist ten strengste aan te raden. Vaak stopt de bloeding vanzelf en veroorzaakt het alleen een verkleuring van de huid. Deze verkleuring verdwijnt binnen enkele weken weer vanzelf. In zeldzame gevallen kan de bloeding zich uitbreiden tot achter het oog. Daardoor kan er druk op de oogzenuw ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot vermindering van het gezichtsvermogen. Ook in dit geval geldt dat contact opnemen met de specialist van belang is om hier een oplossing voor te vinden.

Kleurverschillen tussen de huid boven en onder het litteken

De kleur van de huid in het bovenooglid verloopt in het algemeen van boven naar onder van licht naar donker. Deze overgang kan duidelijker zichtbaar worden omdat er huid is weggenomen. De bloedvaten zijn na de operatie verwijderd; hierdoor is het bovenooglid de eerste tijd na de operatie roder, vooral bij mensen met een dunne huid en een lichte huidskleur.

Na de behandeling

Na de ingreep wordt nog lichte druk uitgeoefend op de wondranden met het oog op de bloedstelping. Wij raden u aan dit te continueren totdat de gaasjes helemaal droog zijn. Vervolgens adviseren wij u de komende dagen regelmatig te koelen. Het is normaal dat de oogleden de eerste dagen na de ingreep gezwollen zijn. Het ergst meestal op de 2e of 3e dag. Na 1 week worden, tijdens de controle, de hechtingen verwijderd.

Te verwachten resultaat

Een ooglidcorrectie van de bovenoogleden biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patiënt uitgevoerd, een goede verbetering en een verfrissende blik. Wees realistisch in uw verwachtingen. De plastisch chirurg die uw behandeling zal uitvoeren heeft een zeer ruime ervaring met deze ingreep.

Vergoeding door de zorgverzekering

Meestal wordt een bovenooglidcorrectie uit cosmetische overwegingen uitgevoerd. In sommige gevallen is de hoeveelheid overtollig huidweefsel echter zo extreem dat het zicht belemmerd wordt. In dat geval worden de kosten voor een bovenooglidcorrectie vergoed. Wanneer u bij ons komt, kunnen we een machtigingsaanvraag opstellen voor uw zorgverzekeraar.

De prijs voor een bovenooglidcorrectie bij Kliniek Mosaderma bedraagt momenteel **€ 850,00** wanneer u deze zelf gaat betalen. Deze prijs is inclusief eventuele controles en nabehandelingen. Het eerste consult/intakegesprek met de plastisch chirurg is vrijblijvend.

Contact opnemen bij complicaties

Mogelijke complicaties zoals een nabloeding of een infectie komen maar zelden voor. Als u na een operatie aan de bovenoogleden ernstige pijn krijgt in of rondom het oog, of het gezichtsvermogen van een van de ogen minder wordt in de eerste uren na de operatie, dient u direct contact op te nemen met Kliniek Mosaderma. Er is dan mogelijk sprake van een bloeduitstorting rondom de oogbol. Als deze niet snel behandeld wordt zou dat in het ergste geval zelfs tot blindheid kunnen leiden. Deze situatie is extreem zeldzaam. Neem ook contact op met Kliniek Mosaderma bij elke andere gebeurtenis waar u zich zorgen over maakt of wanneer u vragen heeft.

Tot slot

Wij zullen ons zo goed mogelijk inzetten om uw verblijf in onze kliniek voor u zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Hierbij staan we altijd open voor kritiek, suggesties of opmerkingen, waardoor de kwaliteit van zorgverlening verbeterd kan worden. Wanneer u tijdens uw verblijf suggesties of opmerkingen heeft, schroom dan niet deze met de arts of een van de assistentes te bespreken.

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 16.30 uur, bereiken via telefoonnummer 045-2080887. Uitsluitend voor spoedeisende gevallen, kunt u na 16.30 uur en in het weekend contact opnemen met de spoedlijn, 06-86895787.