

Blokkade ganglion impar

U heeft met uw behandelend arts afgesproken, dat u in aanmerking komt voor een blokkade van de ganglion impar. Ook is het mogelijk, dat u deze behandeling zojuist ondergaan heeft. De arts heeft u al informatie gegeven over de behandeling. In deze folder kunt u het nog eens rustig nalezen. Tevens kunt u deze folder gebruiken om bijvoorbeeld uw huisarts of werkgever te informeren. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact met Kliniek Mosaderma opnemen. Onderaan deze folder kunt u het telefoonnummer vinden.

Wat is een blokkade van de ganglion impar?


Het ganglion impar is een zenuwknoop die deel uitmaakt van het autonome of onwillekeurig zenuwstelsel. Het ligt aan de voorzijde op de overgang van het heiligbeen en het staartbotje. Dit zenuwstelsel staat voor een deel in voor het pijngevoel in het staartbotje en het gebied rondom de anus.

Voor de behandeling

Voor deze behandeling geldt de algemene voorbereiding, die beschreven staat in de folder "Pijngeneeskunde". Deze folder heeft u bij uw eerste bezoek ontvangen.

De behandeling

De huid wordt gedesinfecteerd en verdoofd. Tijdens de behandeling ligt u op de buik en wordt ter hoogte van de bilnaad de juiste positie voor de naald onder röntgendoorlichting bepaald. Vervolgens wordt er een naald ingebracht in de buurt van de ganglion impar. De arts controleert met contrastvloeistof of de naald op de correcte plaats staat. Vervolgens wordt er een verdovingsvloeistof, al dan niet met corticosteroïden ingespoten.



Duur van de behandeling

De behandeling zelf duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling verblijft u gedurende 15 tot 30 minuten in de kliniek.

De pleister mag dezelfde avond verwijderd worden en u mag gewoon douchen of baden.

Risico's en complicaties

- Bloeduitstorting: dit kan ontstaan als een bloedvatje is geraakt, het veroorzaakt een blauwe plek ter hoogte van de bilnaad.
- Pijnlijke plek in de bilnaad: dit verdwijnt spontaan na 2-3 dagen.
- Pijn in de lies: door prikkeling van een zenuw in de lies. Deze pijn neemt na enkele dagen af.
- Infectie: ontsteking van de insteekplaats, komt zelden voor en gaat gepaard met roodheid en pijn. Dit kan ook optreden ter hoogte van de anus.
- Gevoelsvermindering: het is mogelijk dat er een tijdelijke afname is van het gevoel in de buurt van waar behandeld is.
- Er kunnen blaasfunctiestoornissen optreden.
- Indien er corticosteroïden (ontstekingsremmer) gebruikt zijn kunnen de volgende bijwerkingen optreden.
 - verhoogde of verstoorde bloedsuikerwaarden. Indien u suikerziekte heeft wordt aangeraden de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel te controleren.
 - een rood of warm gezicht
 - opvliegers
 - onregelde menstruatie
 - spierkrampen
 - verminderde werking van de anticonceptie medicijnen. De pil kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn.
- Een zeer zeldzame complicatie is perforatie van de darm, wat nauwelijks klinische gevolgen heeft vanwege de steriele procedure en de kleine naaldgrootte

Te verwachten resultaat

Na de behandeling kan er gedurende enkele dagen sprake zijn van napijn, die over het algemeen goed te behandelen is met een pijnstiller zoals Paracetamol (gebruiken volgens bijsluiter). Het effect wordt tijdens een volgende behandeling besproken.

Let op!

- Informeert u ons voor de behandeling over alle medicijnen, die u gebruikt.
- Informeert u ons voor de behandeling over een (eventuele zwangerschap)
- Denkt u eraan om, indien nodig, contact op te nemen met uw huisarts betreffende het gebruik van eventuele bloedverdunnende middelen.
- Na de behandeling is het onverantwoord, dat u zelf actief aan het verkeer deelneemt. U dient er zelf voor te zorgen, dat u onder begeleiding van een familielid of kennis naar huis gaat.

Tot slot

Wij zullen ons zo goed mogelijk inzetten om uw verblijf in onze kliniek voor u zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Hierbij staan we altijd open voor kritiek, suggesties of opmerkingen, waardoor de kwaliteit van zorgverlening verbeterd kan worden. Wanneer u tijdens uw verblijf suggesties of opmerkingen heeft, schroom dan niet deze met de arts of een van de assistentes te bespreken.

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 16.30 uur, bereiken via telefoonnummer 045-2080887. Uitsluitend voor spoedeisende gevallen, kunt u na 16.30 uur en in het weekend contact opnemen met de spoedlijn, 06-86895787.